



LE PIEGEAGE DE PRINTEMPS

QUAND PIEGER? Dès que les températures remontent, dès les premiers soleils de la mi-février à mai, en modulant en fonction de la météo.

Il est important de renouveler les pièges tous les 8 à 10 jours maximum. Il faut donc les vider sans les laver (attention aux frelons éventuellement vivants présents dans le piège) et renouveler le mélange attractif.

Combien de temps piéger ? Il est possible d'attraper des fondatrices jusqu'à mi-avril voir jusqu'en mai certaines années.

Attention cependant à ne pas laisser trainer des pièges sans vigilance ni renouvellement car ils se transformeront en pièges non sélectifs et attraperont toutes sortes d'insectes qui n'ont rien à faire dans le piège.

LE PIEGEAGE D'AUTOMNE

QUAND PIEGER? De **mi-septembre** à décembre pour diminuer les frelons asiatiques mais aussi pour réduire l'hibernation des futurs fondatrices.

Afin de ne pas capturer d'insectes autres que le frelon asiatique (respect de la biodiversité) il convient d'utiliser les pièges les plus sélectifs.

Quel type de pièges et quel appât utiliser ?

Mélange maison : 2/3 bière alcoolisée et 1/3 sirop de fruits rouges

Ou Sachets prêts a l'emploi

Quel emplacement?

A proximité des anciens nids, dans les arbres et arbustes fleuris.

A proximité de points d'eau bien exposés au soleil

A proximité des composteurs ménagers

A proximité des bâtiments désaffectés, peu fréquentés

Les pièges doivent être installés dans des emplacements au soleil le matin et plutôt à l'ombre l'après midi, entre 50 cm et 1.50 m de hauteur

Retrait des pièges : 6 semaines environ après le début du piégeage



Exemple de pièges



NE PAS CONFONDRE



Vespa Velutina Nigrithorax

Ou « **Frelon Asiatique** »

Ou « Frelon à pattes jaunes »

Thorax noir, abdomen foncé

Jusqu'au 4 -ème segment qui lui est orangé

Pattes jaune clair, face orangée



Vespa Crabro

Ou « **Frelon européen** »

LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES



Après émergence du printemps, la fondatrice va construire seule un petit nid primaire pour élever les premières ouvrières



A l'été les premières ouvrières vont construire un autre nid dit « secondaire » plus gros et en hauteur, mais parfois bas



Pour contact ou organisation conférence : apidor@dordogne.Chambagri.fr

Reconnaitre le frelon asiatique et combattre sa prolifération



FOCUS SUR :
Le piégeage de printemps et d'automne

POURQUOI ?

Pour piéger les fondatrices, limiter le nombre de nids et protéger les pollinisateurs.

Pus de 20 ans après son arrivée dans le Sud-Ouest il a colonisé la France entière et une partie de l'Europe.

- Il n'a pas de prédateur naturel
- Il s'est adapté et a accentué son comportement offensif
- Il continue de progresser de 60 km par an

Les impacts de sa présence se font sentir :

- Sur les pollinisateurs sauvages et la biodiversité,
- Sur l'économie : agriculture, arboriculture, viticulture, commerce de plein air
- Sur la santé humaine : la prolifération de ses nids représente un réel danger. 1 dizaine de morts par an.
- Sur la filière apicole : c'est un prédateur majeur des abeilles mellifères